



Zahmo

Esca insetticida in gel pronto all'uso per il controllo delle formiche.

Titolare della registrazione

Abiotech Institute S.r.l.
Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD), Italia
Tel. +39 049 7485504
www.abiotech.eu

Distributore

Vebi Istituto Biochimico S.r.l.
Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD), Italia
Tel. +39 049 9337111
www.vebi.it

Registrazione

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute n. 8387

Composizione

100 g di prodotto contengono

Deltametrina pura (CAS N.52918-63-5)	2,5 g
Piperonil Butossido puro (CAS N.51-03-6)	1,0 g
Tetrametrina pura (CAS N. 7696-12-0)	0,2 g
Coformulanti q.b. a	100,0 g

Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (CAS 2634-33-5)

Specifiche Prodotto

Codice	Confezione	Cartone	Pallet
03476	Flacone 250 ml	24 pezzi	48 cartoni
03477	Flacone 1 l	12 pezzi	32 cartoni

Caratteristiche Tecniche

ZAHMO è un insetticida in sospensione concentrata a base di Deltametrina e Tetrametrina che garantiscono un buon potere snidante ed abbattente ed una lunga persistenza. Il Piperonil Butossido contenuto nella formula esalta l'effetto abbattente, protegge la Deltametrina dalla degradazione enzimatica e aiuta la sua penetrazione all'interno del corpo dell'insetto.

ZAHMO risulta molto indicato per la lotta agli insetti sia volanti, quali la mosca comune e le zanzare (comune e tigre), che striscianti, quali blatte e formiche

Dosi e modalità di impiego

Uso all'interno e intorno agli edifici.

In ambiti domestici e civili, quali insediamenti industriali e zootecnici (abitazioni, industrie alimentari, magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi, campeggi, villaggi turistici, ristoranti, mense, mezzi di trasporto (escluso aereo), allevamenti, stalle, ricoveri di animali, cucce, concimaie, depositi di rifiuti). In aree verdi urbane, pubbliche e private, per il controllo delle zanzare. Nel trattare le aree verdi, si consiglia di provvedere ad un'uniforme bagnatura della vegetazione, evitando il gocciolamento.

Contro insetti volanti

(mosca, zanzara, zanzare tigre, ecc.): diluire 3-5 ml di prodotto in 1 litro d'acqua (0,3-0,5%); con un litro di soluzione, trattare 10 mq di superficie. Per trattamenti su concimaie e simili, elevare la dose a 0,6%.

Contro insetti striscianti

(blatte, formiche): diluire 5-6 ml di prodotto in 1 litro d'acqua (0,5-0,6%); con un litro di soluzione trattare 10 mq di superficie.

Per trattamenti sul verde all'aperto

(giardini, viali alberati, siepi, tappeti erbosi): diluire 5 ml di prodotto in 1 litro d'acqua (0,5%). Distribuire la soluzione utilizzando atomizzatori a medio-basso volume o altre idonee attrezzature in ragione di 100 litri per 10.000 mq di superficie.

Avvertenze

Nei trattamenti nell'industria alimentare o comunque nei luoghi dove possono essere presenti alimenti, assicurarsi che non siano presenti derrate o prodotti alimentari a meno che non siano sigillati o protetti da possibili irrorazioni. Nell'effettuare trattamenti in ricoveri di animali o cucce allontanare gli animali durante l'intera durata del trattamento ed attendere che la soluzione si sia asciugata sulle superfici prima di reintrodurli nell'area.